





[consultatif d'experts \(SAGE\) de l'OMS](#) pour l'établissement des priorités concernant l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 dans un contexte d'approvisionnement limité. Cette feuille de route prévoit que soient vaccinées d'abord les personnes qui courent un plus grand risque d'être exposées au virus ou qui risquent de souffrir d'une forme plus grave de la maladie si elles contractent le virus. Ces groupes prioritaires comprennent le personnel sanitaire et autres agent(e)s de première ligne, les personnes âgées et les personnes de tout âge présentant des problèmes de santé sous-jacents.

On notera que le Programme est avant tout un programme de santé au travail qui vise à permettre aux membres du personnel de l'ONU de rester dans leur lieu d'affectation et de faire leur travail. Ainsi, celles et ceux qui exercent des fonctions à haut risque seront







d'injection), qui surviennent généralement dans les 4 à 20 jours suivant la vaccination, doivent consulter d'urgence un médecin.

Des caillots sanguins inhabituels avec un faible taux de plaquettes sanguines (comme cela a été rapporté après la vaccination avec le vaccin AZ) doivent être considérés comme des effets secondaires extrêmement rares présentant un faible risque. Bien que des épisodes rares semblent se produire plus fréquemment chez les femmes d'âge moins avancé, il faudra d'